

## **PRUEBAS DE COAGULACIÓN [PT, PTT, FIBRINÓGENO, DÍMERO D, PDF]**

---

### **REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA**

- Para evitar interferencias en la obtención del resultado es preferible que el paciente se encuentre en ayunas (ayuno de 8 a 12 horas, no mayor a este tiempo) para la primera toma, si es un niño menor de 2 años, el ayuno debe ser mínimo de 4 horas.
- No ingiera bebidas alcohólicas mínimo 72 horas (tres días) antes de la realización de exámenes de laboratorio. No realice ejercicios antes de ir a la prueba.
- Si es Hipertenso, Epiléptico o está en tratamiento para la Tiroides, el paciente puede continuar la dosificación de medicamentos como es usual, a menos de que el médico le sugiera lo contrario. Informe durante la recepción si toma medicamentos, dosis y hora de la última toma.
- No tomar el anticoagulante en la mañana hasta después de haberse tomado la muestra.
- Durante la recepción se le preguntará por información clínica como: tratamiento anticoagulante está tomando y la dosis, diagnóstico o propósito del examen, antecedentes del paciente, etc.

### **RECOLECCIÓN DE MUESTRA**

- Se extrae sangre de una vena (venopunción), por lo general, del pliegue interno del codo o del dorso de la mano. Se inserta una aguja en la vena y se recoge la sangre en un tubo.



- Puede sentir un pinchazo o sensación de picadura cuando se inserta la aguja. Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil o un ligero hematoma, los cuales desaparecen pronto.