

## **SECRECIÓN URETRAL, BALANO PREPUICIAL Y GLANDE**

---

### **REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA**

- Se requiere tener abstinencia sexual de mínimo 3 días. Este dato de los días será solicitado en la recepción.
- El día del examen no debe bañarse antes de realizarse la toma de la muestra.
- No orinar dos horas antes del examen, lo cual podrá hacer una vez sea tomada la muestra.
- No aplicarse tratamientos locales
- Los medicamentos de control no se deben interrumpir, tomarlos de la forma habitual e informar en el laboratorio.
- En caso de estar tomando Antibióticos debe terminar el tratamiento y realizarse el examen después de 7 días de haber finalizado.
- Informar si ha presentado fiebre tres días antes del examen.

### **RECOLECCIÓN DE MUESTRA**

- La recolección de la muestra debe realizarse en la sede de proceso, la cual se realizará por el personal entrenado.
- La muestra se recolectara con un hisopo de algodón, en los casos que exista poca secreción se toma con un asa de argolla pequeña introduciéndola unos milímetros y rotando suavemente.



- La muestra se extiende en una lámina portaobjeto y se fija, otra parte de la muestra se introduce en un recipiente con solución perseverante y/o medios de cultivos. Este procedimiento garantiza una mejor calidad de la muestra.