

FROTIS VAGINAL, CULTIVO Y PCR PARA VPH

- **REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA**

- No estar dentro del ciclo menstrual. La fecha ideal para la toma de la muestra es desde 5 hasta 20 días después del último día de sangrado.
- El día del examen debe realizarse el baño normal.
- Se debe suspender la aplicación de medicamentos óvulos o cremas vaginales 8 días antes del examen, espermicidas y lubricantes 48 horas antes y duchas vaginales desde el día anterior.
- Abstinencia sexual 24 horas antes de la toma de la muestra.
- No haberse realizado examen ginecológico 24 horas antes de la toma de la muestra.
- En mujeres embarazadas la muestra se tomará siguiendo el mismo procedimiento para pacientes no embarazadas siempre y cuando no exista antecedentes de amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, hemorragia o cualquier otra contraindicación médica.

- **RECOLECCIÓN DE MUESTRA**

- La recolección de la muestra debe realizarse preferiblemente en la sede de proceso, en casos excepcionales puede ser tomada fuera de sus instalaciones.
- En algunos casos se emplea para la toma de esta muestra un espéculo que permite la visualización del cuello uterino y sus características.



- Con un hisopo de algodón, espátula o citocepillo según aplique para prueba, se realiza una recolección de la secreción al interior de la vagina.
- La muestra se extiende en una lámina portaobjeto y se fija, otra parte de la muestra se introduce en un recipiente con solución persevante. Este procedimiento garantiza una mejor calidad de la muestra.